

Hot Spots
στη Γαστρεντερολογία
Ηπατολογία το 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ




4&5
Νοεμβρίου
2016

Νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών

Ιατρική Εταιρεία
Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου
σε συνεργασία με το
Γαστρεντερολογικό Τμήμα της
Παθολογικής Κλινικής
του Π.Γ.Ν. Πατρών

Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής
Γαστρεντερολογικής
Εταιρείας



SpyGlass™ DS

Direct Visualisation System



You're going to want to see this.™



All cited trademarks are the property of their respective owners. CAUTION: The law restricts these devices to sales by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. Information for the use only in countries with applicable health authority product registrations.



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη διημερίδα με θέμα : «Hot Spots στη Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία το 2016» που συνδιοργανώνει το Γαστρεντερολογικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Πατρών και η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου και θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2016.

Τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδος έχει γίνει στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του πεπτικού συστήματος. Η διημερίδα έχει στόχο την σφαιρική παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της γαστρεντερολογίας και ηπατολογίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συζήτηση θεμάτων της καθημερινής κλινικής πρακτικής, τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και στην νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η επιστημονική εκδήλωση απευθύνεται όχι μόνο στους ιατρούς γαστρεντερολόγους αλλά και σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων με ενδιαφέρον στις παθήσεις του πεπτικού συστήματος.

Πιστεύοντας ότι η επιστημονική αυτή εκδήλωση θα συμβάλει στην υπεύθυνη ενημέρωσή σας και με την πεποίθηση ότι η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της, σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να συμμετάσχετε ενεργά και να συμβάλλετε με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Κωνσταντίνος Θωμόπουλος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση με ή χωρίς Οισοφαγίτιδα,
Γαστροπροστασία από χρόνια χρήση ΜΣΑΦ
Γαστρικά & δωδεκαδακτυλικά έλκη σχετιζόμενα με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
Σύνδρομο Zollinger - Ellison



Για συναγοραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ΠΧΤ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία.

ESACTIVE 1/14
flyingcolours



 **esactive**[®]
Esomeprazole 28tabs x 20mg
28tabs x 40mg



ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Γραφεία Επιστημονικής Ενμέρωσης

• Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 711 • Παπαδιαμαντοπούλου 41 – 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107756226
• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1

www.elpen.gr



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ
Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ
Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Β. ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ
Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
Χ. ΤΣΟΛΙΑΣ
Γ. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΣ
Μ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Χ. ΓΩΓΟΣ
Κ. ΜΙΜΙΔΗΣ
Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ
Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Β. ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 **HARVONI**[®]
ledipasvir/sofosbuvir

Albert Einstein

Η φωτογραφία του Albert Einstein χρησιμοποιείται με την άδεια του HUJ/GreenLight.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Τιμή (Ex-factory): 15.266,13 €

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

HAR/GR/15-01/1027(3)



GILEAD

Advancing Therapeutics.
Improving Lives.

Υπεύθυνος ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για συλλογή ΑΕ:

Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ, Ριζούντος 2 & Θράκης,
167 77 Ελληνικό. Τηλ.: 210 89 30 100, Fax: 210 96 18 260

Για την πλήρη, επικαιροποιημένη Π.Χ.Π. αποσταθείτε στην εταιρεία.

16.00 - 16.30

Εγγραφές - Δωρεάν

16.30 - 18.00

Κατώτερο πεπτικό

Προεδρείο: Μ. Σταυρόπουλος, Β. Μαργαρίτης

Ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα: νεώτερες εφαρμογές.
Κ. Τριανταφύλλου

Η θέση της MRI – CT εντερογραφίας – εικονικής
κολονοσκόπησης στην κλινική πράξη.

Α. Καρατζάς

Κολονοσκόπηση και πολυπεκτομή: Πώς θα βελτιώσουμε
την ποιότητα και ποιές είναι οι δυνατότητες του ενδοσκόπου;

Σ. Μπασιούκας

Καρκίνος ορθού: Σύγχρονη αντιμετώπιση

Γ. Σκρουμπής

18.00 - 18.30

Διάλειμμα - Καφές

18.30 - 20.00

Χοληφόρα - Πάγκρεας

Προεδρείο: Δ. Καραβίας, Χ. Τριάντος

Λοιμώξεις χοληφόρων και ηπατικά αποστήματα.

Σ. Ασημακόπουλος

EUS σε παθήσεις χοληφόρων παγκρέατος;

Πότε και σε ποιούς ασθενείς;

Δ. Κυπραίος

Καλοήθεις παθήσεις χοληφόρων: διαγνωστικά και
θεραπευτικά διλήμματα

Χ. Κωνσταντάκης

Οξεία παγκρεατίτιδα: θεραπευτικά διλήμματα

Ι. Κεχαγιάς

20.00 - 21.00

Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

**Εναρκτήρια
Ομιλία**

Η εξέλιξη της γαστρεντερολογίας στην περιοχή μας.
Β. Νικολοπούλου

Ομότιμη καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

21.30

Δείπνο - Εστιατόριο DECK, Ηρ. Πολυτεχνείου 42

9.00 - 10.30

Ανώτερο Πεπτικό

Προεδρείο: Δ. Χριστοδούλου, Ν. Βιάζης

Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. Μία νέα πάθηση;
Γ. Διαμαντοπούλου

Μακροχρόνια θεραπεία με πραζόλες. Είναι ασφαλή φάρμακα;
Β. Θεόπιστος

Μανομετρία, πεχαμετρία, εμπέδηση: Πότε και σε ποιούς ασθενείς;
Γ. Καραμανώλης

H. Pylori: Τι νεώτερο το 2016;
Π. Αποστολόπουλος

10.30 - 11.00

Διάλεξη

Προεδρείο: Ε. Κατσακούλης

Ενδοσκόπηση (διαγνωστική – θεραπευτική) σε ασθενή υπό
αντιθρομβωτική αγωγή

Κ. Παρασκευά

11.00 - 11.30

Διάλειμμα - Καφές

11.30 - 13.00

Ηπατίτιδες

Προεδρείο: Χ. Γώγος, Γ. Παπαθεοδωρίδης

Παλαιά και νέα φάρμακα στην ηπατίτιδα C το 2016
M. Deutsch

Χρόνια ηπατίτιδα C: Κατευθυντήριες οδηγίες
I. Βλαχογιαννάκος

Ηπατίτιδα B: Ενδείξεις έναρξης και διακοπής θεραπείας.
Σ. Μανωλακόπουλος

Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
Α. Τσιντώνη

13.00 – 14.00

Ήπαρ

Προεδρείο: Χ. Καρατζά, Ι. Μαρούλης

“Φαρμακευτική ηπατίτιδα”: ένα συχνό πρόβλημα στην κλινική πράξη

Κ. Μιμίδης

HK Ca: διαγνωστικά και θεραπευτικά

διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών.

Ι. Ελευσινιώτης

14.00 – 15.15

Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

15.15 – 16.45

Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου

Προεδρείο: Β. Νικολοπούλου, Γ. Μάντζαρης

Πρόγραμμα εμβολιασμών σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.

Πότε και σε ποιούς;

Γ. Θεοχάρης

ΑντιTNF παράγοντες: διλήμματα στην έναρξη – παρακολούθηση και διακοπή θεραπείας.

Κ. Κατσάνος

Αντι-ιντεγκρίνες: η θέση τους στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΙΦΝΕ

Γ. Μπάμιας

Διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση της περιεδρικής νόσου Crohn

Ι. Παπακωνσταντίνου

16.45 – 17.00

Συμπεράσματα - Τέλος Διημερίδας



Η εκδήλωση πληροί τα κριτήρια ποιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις του εγγράφου D 2012/30 EACCME - UEMS και θα μοριοδοτηθεί CME-CPDcredits.

Απονομή Πιστοποιητικών με την παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.



PENTASA[®] 2_g

MESALAZINE

Prolonged release granules

Στην Έξαρση και την Ύφεση
της Ελκώδους Κολίτιδας



Έως και
4g άπαξ
ημερησίως

7-2016/PENTASA/10-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Pentasa 2 g ΚΟΚΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε φακελάκι περιέχει 2 g μεσαλαζίνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. **4.3 Αντενδείξεις.** Υπερευαίσθησια στη μεσαλαζίνη, σε κάποιο από τα έκδοχα, ή στα σαλικυλικά. Σοβαρή ηπατική και/ή νεφρική δυσλειτουργία. **4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.** Συνιστάται προσοχή όταν λαμβάνουν θεραπεία ασθενείς με αλλεργία στη σουλφασαζίνη (κίνδυνος αλλεργίας στα σαλικυλικά). Σε περιπτώσεις οξέων συμπτωμάτων δυσανεξίας, δηλ. εμφανή κοιλιακών κρampfών, κοιλιακού άλγους, πυρετού, σοβαρής κεφαλαλγίας και εξάνθηματος, η θεραπεία πρέπει να διακοπτεται άμεσα. Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με βλάβη της ηπατικής λειτουργίας. Οι παράμετροι της ηπατικής λειτουργίας όπως η ALT ή η AST πρέπει να αξιολογούνται πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ανάλογα με την κρίση του θεράποντα γιατρού. Το φάρμακο δε συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με βλάβη της νεφρικής λειτουργίας και σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται τακτικά (π.χ. κρεατινίνη ουρού), ειδικότερα κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της θεραπείας. Η κατάσταση των ουροφόρων οδών (με χρωματομετρικές ταινίες εμβάπτισης) πρέπει να προσδιορίζεται πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας ανάλογα με την κρίση του θεράποντα γιατρού. Σε ασθενείς που εμφανίζουν νεφρική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο νεφροτοξικότητας επαγόμενης από τη μεσαλαζίνη. Η ταυτόχρονη χρήση άλλων γνωστών νεφροτοξικών παραγόντων, όπως είναι τα ΜΣΑΦ και η αζθειοπρίνη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νεφρικών αντιδράσεων. Προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ενεργό πεπτικό έλκος. Ασθενείς με

πνευμονική νόσο, ειδικότερα με άσθμα, πρέπει να παρακολουθούνται πολύ προσεκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έχουν αναφερθεί σπάνια αντιδράσεις καρδιακής υπερευαίσθησίας (μυο- και περικαρδίτιδα) που επάγονται από τη μεσαλαζίνη. Πολύ σπάνια έχει αναφερθεί σοβαρή δυσκρασία του αίματος με μεσαλαζίνη (βλ. παράγραφο 4.5). Συνιστάται να πραγματοποιούνται εξετάσεις αίματος για τη διαφορική μέτρηση του αίματος πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ανάλογα με την κρίση του θεράποντα γιατρού. Η θεραπεία πρέπει να διακοπτεται όταν υπάρχει υποψία ή ένδειξη αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών. Ως κατευθυντήρια γραμμή, συνιστώνται έλεγχοι παρακολούθησης 14 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας, και ακολούθως δύο έως τρεις επιπλέον έλεγχοι σε διαστήματα των 4 εβδομάδων. Εάν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, οι έλεγχοι παρακολούθησης πρέπει να διεξάγονται κάθε τρεις μήνες. Εάν εμφανιστούν επιπρόσθετα συμπτώματα, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξάγονται άμεσα. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες.** Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές είναι διάρροια (3%), ναυτία (3%), κοιλιακό άλγος (3%), κεφαλαλγία (3%), έμετος (1%), και εξάνθημα (1%). Μπορεί να εμφανισθούν περιστασιακά αντιδράσεις υπερευαίσθησίας και πυρετός λόγω του φαρμάκου. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ, Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα, Τηλ.: 210 6843 449, Fax: 210 6844 721. **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(Ι) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 56794/11/19-11-2012. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 19-11-2012. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 16-12-2014. **Ν.Τ. €62,95, Α.Τ. €92,04** (Ελλάδα). Περιλαμβάνεται στον Θετικό Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων **ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** (Κύπρος): 021943. Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο: Α. Potamitis Medicare Ltd, Τηλ.: +357 22563333

FERRING

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ

Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210 6843449, fax: 210 6844721

www.ferring.gr

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

LAPRAZOL® FASTAB 30mg

Lansoprazole Tablets



ΜΕΙΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΣΤΕ



ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης

ΑΘΗΝΑ: Οδός Τατσοίου 146 71 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111

E-Mail: mailbox@vianex.gr • **INTERNET:** <http://www.vianex.gr>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακάδημου 113, Κόμβος Μακρυγιάννη Εύσσομος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56224, Τηλ: 2310 861683



VE 15129 LAPR/1-9/2015

 **Entyvio**[®] ▽
vedolizumab



GR/EV/1610/0015

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται
από την εταιρεία κατόπιν αιτήσεως



Monumental Plaza, Κτίριο Γ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801
www.takeda.gr



INFLECTRA™
INFLIXIMAB

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τοπικός Αντιπρόσωπος:



AENORASIS
Intuition in Healthcare

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

**ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου,
151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 6136332, Φαξ: 210 8105298
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Δελφών 17, 555 35 Πυλαία
Τηλ.: 2310 326136, Φαξ: 2310 306790**


Hospira
A  Company

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Deutsch M.

Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ.

Αποστολόπουλος Π.

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, "ΝΙΜΤΣ"

Ασημακόπουλος Σ.

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Πατρών

Βιάζης Ν.

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός"

Βλαχογιαννάκος Ι.

Επ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γώγος Χ.

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής

Διαμαντοπούλου Γ.

Γαστρεντερολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Π.Γ.Ν. Πατρών

Ελευσινιώτης Ι.

Παθολόγος-Ηπατολόγος, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ", Αν. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεόπιστος Β.

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Πατρών

Θεοχάρης Γ.

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Πατρών

Θωμόπουλος Κ.

Αν. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πανεπιστημιακού Γαστρεντερολογικού Τμήματος

Καραβίας Δ.

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Καραμανώλης Γ.

Επ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Καρατζά Χ.

Καθηγήτρια Παθολογίας - Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Καρατζάς Α.

Ακτινολόγος, Ολύμπιον Θεραπευτήριο

Κατσακούλης Ε.

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Πατρών

Κατσάνος Κ.

Επ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κεχαγιάς Ι.

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΜΕ ΤΟ DAKLINZA® (Daclatasvir) ΩΣ ΣΥΜΜΑΧΟ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ...

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Σας παρουσιάζουμε το Daklinza, έναν ισχυρό, παν-γονοτυπικό (*in vitro*) αναστολέα της NS5A με κλινική αποτελεσματικότητα σε πολλαπλούς γονότυπους.^{1,2}

Το Daklinza μαζί με sofosbuvir είναι ένα από στόματος χορηγούμενο σχήμα χωρίς ιντερφερόνη, το οποίο θεραπεύει* τη χρόνια ηπατίτιδα C στην πλειοψηφία των ασθενών σας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, όπως προχωρημένη κίρρωση, αποτυχία της θεραπείας με αναστολέα της πρωτεάσης (PI) ή γονότυπο 3.^{1,2}

*Σε μακροχρόνιες μελέτες παρακολούθησης έχει καταδειχθεί ότι η SVR₁₂ αντιστοιχεί σε οριστική ίαση της λοίμωξης από HCV τουλάχιστον στο 99% των περιπτώσεων^{1,2}

Βιβλιογραφικές παραπομπές

1. Sulkowski MS, Gardner DF, Rodriguez-Torres M et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. *N Engl J Med*. 2014;370:211-221.
2. DAKLINZA™ (daclatasvir) Summary of Product Characteristics. Bristol-Myers Squibb Company; March 2014.
3. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. *J Hepatol*. 2014;60:392-420.
4. Swain MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alpha-2a and ribavirin. *Gastroenterology*. 2010;139:1593-1601

 **NEO**
Daklinza®
(daclatasvir)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 Bristol-Myers Squibb

© 2014 Bristol-Myers Squibb Company 1392GR14PR08363-01 DAK/09-2014/4/1
Απευθυνθείτε στην Bristol-Myers Squibb για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Κυπραίος Δ.

Γαστρεντερολόγος, Α.Ο.Ν.Α "Άγιος Σάββας"

Κωνσταντάκης Χ.

Γαστρεντερολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Γ.Ν. Πατρών

Μάντζαρης Γ.

Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ
Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Μανωλακόπουλος Σ.

Επ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μαργαρίτης Β.

Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ
Γαστρεντερολογικού Τμήματος Γ. Ν. Πατρών

Μαρούλης Ι.

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Πατρών

Μιμίδης Κ.

Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Μπάμιας Γ.

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Λαϊκό Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών

Μπασσιούκας Σ.

Γαστρεντερολόγος, Επεμβατικός Ενδοσκόπος, Β' Ενδοσκοπικό
Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Νικολοπούλου Β.

Ομότιμη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Πατρών

Παπαθεοδωρίδης Γ.

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ

Παπακωνσταντίνου Ι.

Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Β' Χειρουργική
Κλινική, "Αρεταίειο" Νοσοκομείο

Παρασκευά Κ.

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κωνσταντοπούλειο
Νοσοκομείο, Πρώην "Αγία Όλγα"

Σκρουμπής Γ.

Επ. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Πατρών

Σταυρόπουλος Μ.

Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Τριανταφύλλου Κ.

Επ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας, Π. Γ.Ν. "Αττικόν"

Τριάντος Χ.

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Πατρών

Τσιντώνη Α.

Παθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Πατρών

Χριστοδούλου Δ.

Αν. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Segmented Esophageal Stent

Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια δραστηριοποίησης της VIVAMED στο χώρο της Γαστρεντερολογίας, σας παρουσιάζουμε τη νέα Μεταλλική Ενδοπρόθεση Οισοφάγου τύπου Segmented.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Μαζί με εσάς μεγαλώσαμε!



The new innovative stent design is following a modular approach which adapts effectively to the human anatomy.



The space between the modules are collapsing and expanding during peristalsis.



The adaptation to the bodies movement reduces the risk of migration and improves the comfort of the patient.

Ergonomic design for improved comfort.

Segmented Esophageal Stent

- Silicon coated Nitinol-Stent
- Transparent outer tubing with graduation
- Easy handling and optimal deployment time
- Stent design with smooth atraumatic stent ends
- Effective anchorage and migration prevention
- Nylon threads on both stent ends for repositioning

Specification:

- OTW (Over-The-Wire) Application
- Application set diameter 8 mm
 - Length: 70 cm
- Recommended guide wire: .035" (0.9 mm)

Placement method proximal

Order No.	Length	Stent-Ø	Tulip-Ø	Coating	Packing unit
ESO-4-20-60-SEG	60 mm	20 mm	30 mm	full	1 piece
ESO-4-20-80-SEG	80 mm	20 mm	30 mm	full	1 piece
ESO-4-20-100-SEG	100 mm	20 mm	30 mm	full	1 piece
ESO-4-20-120-SEG	120 mm	20 mm	30 mm	full	1 piece



MEDICAL BREAKTHROUGHS MAY COME OUT OF THE LAB.
BUT THEY BEGIN IN THE HEART.

For more than a century, a very special passion has driven the people of MSD. Our goal is to develop medicines, vaccines, and animal health innovations that will improve the lives of millions. Still, we know there is much more to be done. And we're doing it, with a long-standing commitment to research and development. We're just as committed to expanding access to healthcare and working with others who share our passion to create a healthier world. Together, we'll meet that challenge. With all our heart.

To learn more about our efforts, visit msd.com



125
YEARS
SINCE 1891

Ευχαριστούμε τις εταιρείες:

abbvie



AENORASIS
Intuition in Healthcare



FERRING

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ



Medtronic



Τυπώθηκε με την ευγενική χορηγία της:



Γραμματεία - πληροφορίες:

CPR
conferences - public
relations

Πετρέζα 11, Καστελόκαμος, 264 42 Πύοι
Τηλ.: 2610.995 698, Fax: 2610.995 691
e-mail: cpr@pat.forthnet.gr
www.cprconferences.gr